

Название	Расположение	Показания
Е1(2) чэн-ци	под зрачком на середине нижнего края орбиты	близорукость, дальнозоркость, слезотечение, астигматизм, неврит зрительного нерва, ритинит, катаракта, блефарит, парез мышц глазного яблока; периферический паралич лицевого нерва с птозом века, парез мимических мышц рта
Е2(3) сы-бай	вертикально ниже зрачка на 1 цунь и ниже точки Е1 чэн-ци на 1 см	конъюнктивит, глаукома, кератит; невралгия II ветви тройничного нерва, парез лицевого нерва, птоз века, опущение угла рта, тик мышц верхнего века; головная боль и головокружение
Е3(6) цзюй-ляо	в носогубной складке на пересечении вертикальной линии от центра зрачка с горизонтальной линией через точку VG26 жэнь-чжун	глаукома, слезотечение; невралгия I ветви тройничного нерва, птоз века, опущение угла рта, тик мышц века; носовое кровотечение; боли в зубах верхней челюсти, воспалительные процессы в подчелюстной области, щеки и губ
Е4(6) ди-цан	снаружи от угла рта на 1 см, на вертикальной линии от зрачка	невралгия тройничного нерва, парез лицевого нерва, тики и птоз века, опущение угла рта, слюнотечение
Е5(8) да-ин	спереди от угла нижней челюсти на 1,33 цуня, несколько кнаружи от места, где прощупывается пульсация артерии	парез лицевого нерва; спазм жевательных мышц (тризм), спазм мышц шеи; опущение угла рта, расстройства речи; воспалительные явления на нижней челюсти, в области щеки, боли в зубах, отек лица; паротит
Е6(7) цзя-чэ	спереди и сверху от угла нижней челюсти, где пальпируется углубление	парез лицевого нерва, птоз века, опущение угла рта; охриплость; невралгия III ветви тройничного нерва, боли в зубах нижней челюсти, тризм; боли и напряжение затылочных мышц; паротит

Е7(5) ся-гуань	спереди от уха, во впадине, которая образуется нижним краем скуловой кости и вырезкой нижней челюсти	паралич лицевого нерва, невралгия III ветви тройничного нерва, шум в ушах, птоз века, опущение угла рта; боль в зубах; пародонтоз, артрит или вывих височ-но-нижнечелюстного сустава; отит
Е8(1) тоу-вэй	в углу лба на 1,5 см от угла лба в сторону височной впадины или снаружи от точки VG24 шэнь-тин на 4,5 цуня	Парез лицевого нерва, невралгия I ветви тройничного нерва, мигрень; конъюнктивит, слезотечение, снижение остроты зрения
Е9 жэнь-ин	на уровне и снаружи от верхнего края щитовидного хряща на 1,5 цуня спереди от грудино-ключично-сосцевидной мышцы, где чувствуется	ларингит, тонзиллит, абсцесс горла, дисфагия; астма, легочные заболевания; заикание; гипертензия
Е10 шуй-ту	снаружи от нижнего края щитовидного хряща, у переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы	бронхит, тонзиллит; тяжелая одышка, удушье
Е11 ци-шэ	у верхнего края грудинного конца ключицы, кнаружи от средней линии груди на 1,5 цуня	ларингит, тонзиллит, удушье; напряжение затылочных и шейных мышц
Е12 цюэ-пэнь	в центре надключичной ямки, кнаружи от средней линии груди на 4 цуня	плеврит, удушье; тоническое напряжение затылочных мышц; боли в надключичной ямке; боль в горле
Е13 ци-ху	под ключицей, на сосковой линии, в сторону от средней линии груди на 4 цуня	бронхиальная астма, бронхит, одышка, плеврит, боли в груди и в области спины; отсутствие аппетита, икота

Е14 ку-фан	в первом межреберье, вертикально ниже точки Е13 ци-ху по сосковой линии	бронхит, боли в груди, выделение густой и гнойной мокроты; боли в подреберье
Е15 у-и	во втором межреберье, вертикально ниже точки Е14 ку-фан	бронхит, одышка, боли в груди и подреберье; боль в молочной железе
Е16 ин-чуан	в третьем межреберье, вертикально ниже точки Е15 у-и	кашель, одышка, удушье, бронхиальная астма; боль в ребрах; мастит, спазмы кишечника
Е17 жу-чжун	в четвертом межреберье, в центре соска (у мужчин)	кашель, бронхит
Е18 жу-гэнь	в пятом межреберье, кнаружи от центральной линии на 4 цуня	мастит, недостаток молока; боли в груди; икота, отрыжка, отсутствие аппетита; межреберная невралгия, плеврит
Е19 бу-жун	кнаружи от средней линии на 2 цуня, у нижнего края прикрепления хряща VIII ребра к груди	заболевания печени, желудка, легких; боли в подложечной области, рвота с кровью, потеря аппетита; кашель, одышка, боль в области спины и груди, бронхиальная и сердечная астма
Е20 чэн-мань	ниже точки Е19 бу-жун на 1 цунь, выше пупка на 5 цуней, кнаружи от средней линии на 2 цуня	межреберная невралгия; спазмы желудка и кишечника, отсутствие аппетита, понос, сильная боль в подреберье, рвота с кровью; кашель, одышка
Е21 лян-мэнь	выше пупка на 4 цуня и кнаружи от средней линии на 2 цуня, вертикально ниже точки Е19 бу-жун на 2 цуня	язвенная болезнь желудка, острый и хронический гастрит, понос, спастические боли в кишечнике и желудке, потеря аппетита

Е22 гуань-мэнь	выше уровня пупка на 3 цуня и кнаружи от средней линии на 2 цуня	острый гастрит, боли и урчание в животе, понос, отсутствие аппетита, боль вокруг пупка, нарушения перистальтики кишечника; асцит
Е23 тай-и	на 2 цуня выше пупка и кнаружи от средней линии на 2 цуня	нервно-психические нарушения тревожно-депрессивного характера; расстройства желудочно-кишечного тракта; ночное недержание мочи
Е24 хуа-жоу-мэнь	на 1 цунь выше пупка и кнаружи от средней линии на 2 цуня	тошнота и рвота, хронический гастроэнтерит; глоссит, абсцесс в языке или подъязычной области; асцит, эндометрит, расстройства психики
Е25 тянь-шу	на уровне пупка и кнаружи от средней линии на 2 цуня	острый и хронический гастрит, неукротимая рвота и понос, дизентерия, боль вокруг пупка, запор; холецистит; асцит, нарушения менструального цикла, эндометрит
Е26 вай-лин	ниже пупка на 1 цунь и кнаружи от средней линии на 2 цуня	боли в животе, особенно в области пупка, боли при грыже, дискинезия кишечника, ощущение тяжести в эпигастральной области
Е27 да-цзюй	на 2 цуня ниже пупка и кнаружи от средней линии на 2 цуня	дизентерия, запор, боли в нижней части живота, выпадение прямой кишки; затрудненное мочеиспускание, цистит, боль в наружных половых органах, воспаление яичка; эндометрит, нарушение менструального цикла
Е28 шуй-дао	ниже пупка на 3 цуня, кнаружи от средней линии на 2 цуня	гастрит; нефрит, задержка мочи, цистит; боли в наружных половых органах, нарушение менструального цикла, воспаление яичка
Е29 гу и-лай	ниже пупка на 3 цуня, кнаружи от средней линии на 2 цуня	гастрит; нефрит, задержка мочи, цистит; боли в наружных половых органах, нарушение менструального цикла, воспаление яичка

Е30 ци-чун	у верхнего края лобковой кости, кнаружи от средней линии живота на 2 цуня	заболевания половых органов, боли в половом члене, в яичках, боли при грыже; аменорея, метроррагия, акушерская патология, ригидность шейки матки, задержка отхождения последа
Е31 би-гуань	в середине паховой складки	парез и паралич нижних конечностей, нарушение чувствительности кожи бедра и голени, боли в области поясницы; паховый лимфаденит
Е32 фу-ту	на переднебоковой поверхности бедра, выше верхнего края коленной чашечки на 6 цуней	парез и паралич нижних конечностей, боли в области поясницы, в тазобедренном суставе, в коленном суставе; крапивница
Е33 инь-ши	выше верхнего края коленной чашечки на 3 цуня, в углублении между прямой и наружной широкой мышцами бедра	парез и паралич нижних конечностей, боли в коленном суставе, ограничения движений в пояснице и нижних конечностях
Е34 лян-цю	выше верхнего края коленной чашечки на 2 цуня, где пальпируется небольшое углубление	боли и ограничения движения в коленном суставе, боли в пояснице и нижней конечности, снижение чувствительности кожи нижней конечности; боль в молочной железе, мастит; тяжесть в желудке, понос
Е35 ду-би	на передненааружной поверхности голени у нижнего края коленной чашечки, выше латерального мыщелка большеберцовой кости, где пальпируется углубление	боли и ограничение движений в коленном суставе

Е36 цзу-сань-ли	ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости на 3 цуня, у переднего края большеберцовой мышцы	нарушение функции желудка, гастрит, язвенная болезнь, боль в подложечной области, метеоризм, энтерит, запор, рвота, понос; боль в коленном суставе и голени; заболевания глаз; лихорадочное состояние; недержание мочи; гипертензия, астенические состояния; общее тонизирующее действие
Е37 шан-цзюй-суй	вертикально ниже точки Е36 цзу-сань-ли на 3 цуня	нарушения функции селезенки и желудка, боли вокруг пупка, хронический понос; артрит коленного сустава, нарушение кожной чувствительности и движений в нижних конечностях; эта точка регулирует функцию толстой кишки
Е38 тяо-коу	ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости на 8 цуней, вертикально ниже точки Е37 шан-цзюй-суй на 2 цуня	боли в колене и стопе, парез нижних конечностей; нарушение функции желудка
Е39 ся-цзюй-суй	ниже верхнего края латерального мыщелка большеберцовой кости на 9 цуней, вертикально ниже точки Е38 тяо-коу на 1 цунь	острый и хронический гастроэнтерит, понижение аппетита, боли в подреберье и нижней части живота; миозит ног, артрит стопы; мастит; нарушение кровообращения в головном мозге; эта точка регулирует функцию тонкой кишки
Е40 фэн-лун	выше центра латеральной лодыжки на 8 цуней, на уровне и кзади от точки Е38 тяо-коу на 1 цунь	кашель, одышка, обильная мокрота, боли в груди и животе; головная боль, головокружение; паралич или парез нижних конечностей с нарушением акта дефекации; патологическая сонливость, эпилептиформные судороги, шизофрения

Е41 цзе-си	на тыльном сгибе стопы, кзади от точки Е42 чун-ян на 1,5 цуня, где пальпируется углубление, на одной линии со II пальцем	тонирующая точка. Показания: головная боль, головокружение; паралич нижних конечностей с затруднением дефекации; боли в коленном и голеностопном суставах; эпилептиформные судороги
Е42 чун-ян	на самом возвышенном участке тыла стопы, где пальпируется пульсация артерии, выше межпальцевого промежутка на 5 цуней	отек лица, птоз века, опущение угла рта; боли в зубах верхней челюсти, гингивит; боли в желудке, рвота, отсутствие аппетита; парез и артриты нижних конечностей, боли в тыльной поверхности стопы; психические нарушения
Е43 сянь-гу	в межкостном промежутке между II и III плюсневными костями, кзади от плюснефалангового сустава	отек лица, тонзиллит; отечность и боль тыльной поверхности стопы, боль в пятке; лихорадочные состояния: желудочно-кишечные заболевания; асцит
Е44 нэй-тин	спереди от II и III плюснефаланговых суставов	зубная боль, гингивит; головная боль; ринит, кровотечение из носа, тонзиллит, спазм голосовых связок; тик и спазм мимических мышц рта; боли в желудке, понос, дизентерия, отсутствие аппетита; отечность и боль в тыльной части стопы
Е45 ли-луй	на 0,3 см от наружную края ногтя II пальца стопы. Функция: седативная точка	отек лица, парез лицевого нерва; зубная боль, носовое кровотечение «тонзиллит»; диспепсия, отсутствие аппетита; похолодание стопы и голени; боли в паху; асцит; ночные кошмары, маниакальное состояние, эпилептиформные припадки