

Название	Расположение	Показания
G11 шан-ян	на лучевой стороне II пальца, на 2-3 мм кнаружи от угла ногтевого ложа, в месте перехода кожи с тыльной поверхности на ладонную	обморок, кома, отек слизистой оболочки горла; боль в глазах при глаукоме; шум в ушах, глухота; боли в плечевом суставе и спине с иррадиацией в надключичную ямку; онемение пальцев, лихорадочные состояния
G12 эр-цзянь	во впадине кпереди от пястно-фалангового сустава II пальца с лучевой стороны в месте перехода тыльной поверхности в ладонную	понижение остроты зрения; ринит, кровотечение из носа, ларингит, тонзиллит; стоматит, зубная боль; боли в плечевом суставе и спине, лихорадка
G13 сань-цзянь	сзади от пястно-фалангового сустава II пальца	одышка; невралгия тройничного нерва, боль в глазах, зубах нижней челюсти; боль и отечность слизистой оболочки горла; онемение и отечность пальцев и тыльной поверхности кисти; понос, метеоризм
G14 хэ-гу	между I и II пястными костями, ближе к середине II пястной кости, в ямке	неврит лицевого нерва, парез мимических мышц рта, птоз век; зубная боль, тризм, головная боль; носовое кровотечение, шум в ушах, глухота, боль и отек слизистой оболочки горла; контрактура пальцев, боль в наружной поверхности предплечья; лихорадочные состояния при переохлаждении, потливость; аменорея

G15 ян-си	на уровне складки лучезапястного сустава с лучевой стороны, в анатомической табакерке	головная боль, зубная боль; шум в ушах и глухота, ринит, боль и отек слизистой оболочки горла; боль в лучезапястном суставе и кисти; гемиплегия; диспепсия у детей
G16 пянь-ли	на тыльной поверхности предплечья с лучевой стороны выше точки G15 ян-си на 3 цуня, где пальпируется небольшое углубление	понижение остроты зрения; ринит, ларингит, кровотечение из носа, шум в ушах, глухота; неврит лицевого нерва; боль в плечевом поясе и верхней конечности; запор
G17 вэнь-лю	посредине расстояния от локтевого до лучезапястного сустава на тыльной поверхности предплечья с лучевой стороны или выше точки G15 ян-си на 6 цуней	головная боль; стоматит, глоссалгия, паротит, ларингит; боль в области плечевого сустава, предплечья и спины: урчание и боль в животе; карбункул и инфильтрат на лице
G18 ся-лянь	выше точки G16 пянь-ли G17 вэнь-лю на 2 цуня, у лучевого края лучевой кости в мышечной бороздке	головная боль, головокружение, боли в локтевом суставе и предплечье; боль вокруг пупка, диспепсия, стул с кровью; мастит
G19 шан-лянь	на тыльной поверхности предплечья, в верхней четверти расстояния от локтевого сустава до луче-запястного, на 3 цуня ниже линии, проведенной от латерального надмыщелка к концу складки локтевого сгиба	головная боль; боль в плечевом суставе и плече; односторонний паралич верхней конечности, парестезии и боль в тыльной поверхности предплечья; урчание и боль в животе (спазмы кишечника)

GI10 шоу-сань-ли	на тыльной поверхности предплечья с лучевой стороны, выше точки GI9 шан-лянь на 1 цунь и ниже точки GI11 цюй-чи на 2 цуня	инсульт, гемиплегия, боль и снижение чувствительности кожи в области плечевого сустава и плеча, неврит лучевого нерва, опущение угла рта при парезе лицевого нерва; рвота, понос, непроизвольная дефекация; головная боль при гриппе; мастит
GI11 цюй-чи	на середине расстояния между латеральным надмыщелком и лучевым концом складки локтевого сгиба	боль в суставах верхних конечностей, паралич верхних конечностей; лихорадочное состояние; туберкулез легких; нарушение перистальтики кишечника; крапивница, экзема, нейродермит; неврастения; нарушение менструального цикла; гипертензия
GI12 чжоу-ляо	у дистального конца наружного края плечевой кости, выше наружного надмыщелка и выше точки GI11 цюй-чи на 1 цунь	боль, контрактура плечевого и локтевого суставов, парестезии и снижение кожной чувствительности плеча и локтевого сустава, паралич верхних конечностей
GI13 шоу-у-ли	выше наружного надмыщелка и локтевого сгиба на 3 цуня перпендикулярно	кашель, пневмония; боль и затруднение движения плечевого и локтевого суставов; фобии, сонливость
GI14 би-нао	на наружной поверхности плеча выше локтевого сгиба на 7 цуней	тоническое напряжение шейных и затылочных мышц, боль и затруднение движения верхней конечности; туберкулезный лимфаденит в области шеи

GI15 цзянь-юй	между акромиальным отростком лопатки и большим бугром плечевой кости, где при поднимании руки образуется углубление	боли в области плечевого сустава и плеча, паралич верхних конечностей; кожные сыпи аллергического характера; гипертензия
GI16 цзюй-гу	во впадине, образуемой сочленением ключицы и акромиального отростка лопатки на высоте плечевого сустава	боли в наружной поверхности плеча и плечевом суставе с затруднением движения (плексит); зоб; туберкулез, кровохарканье; боль в нижней челюсти
GI17 тянь-дин	у заднего края нижней части грудино-ключично-сосцевидной мышцы, выше надключичной ямки, ниже точки GI18 фу-ту на 1 цунь	ларингит, внезапная потеря голоса, тонзиллит, затруднение глотания
GI18 фу-ту	снаружи от верхнего края щитовидного хряща, в центре проекции грудино-ключично-сосцевидной мышцы, кзади от точки E9 жэнь-ин на 1,5 цуня	кашель, одышка, свистящие хрипы, астма; затруднение глотания, внезапная потеря голоса, расстройства саливации; гипотензия
GI19 хэ-ляо	на середине расстояния между крылом носа и краем верхней губы, кнаружи от средней линии (от точки VG26 жэнь-чжун) на 0,5 цуня	снижение обоняния, кровотечение из носа, полип носа, вазомоторный ринит; парез мимических мышц рта, тризм, фурункул лица; астма
GI20 ин-сян	в боковой борозде крыла носа, перпендикулярно ниже внутреннего угла глаза (под точкой V1 цин-мин)	одышка, заложенность носа, полип носа, потеря обоняния, кровотечение из носа, парез лицевого нерва, птоз века, опущение угла рта; воспаление и зуд кожи лица