

<b>Название</b>	<b>Расположение</b>	<b>Показания</b>
<i><b>С1 цзи-цюань</b></i>	в подмышечной ямке, где пальпируется пульсация артерии	боли в области сердца и левой руке; депрессивное состояние; тошнота, желтушность склер; боли в плечевом и локтевом суставах
<i><b>С2 цин-лин</b></i>	на передневнутренней поверхности плеча, на одной горизонтали с точкой С1 цзи-цюань, выше локтевого сгиба на 3 цуня	боли в области сердца и «руке; головная боль; желтушность склер, боли в подреберье, ограничение движений в плечевом суставе
<i><b>С3 шао-хай</b></i>	на складке локтевого сгиба, в середине расстояния между внутренним концом складки и внутренним надмыщелком плечевой кости	боль в области сердца, функциональные нарушения сердечной деятельности, головокружение, рвота; онемение кожи плеча, тремор рук, боль по ходу локтевого нерва, боль в подмышечной области; ухудшение памяти, психические расстройства
<i><b>С4 лин-дао</b></i>	выше проксимальной лучезапястной складки на 1,5 цуня	боль в области сердца; внезапная потеря голоса; боли в предплечье и локтевом суставе, неврит локтевого нерва; депрессия, навязчивое чувство страха, бессонница

<p><i>С5 тун-ли</i></p>	<p>выше проксимальной лучезапястной складки на 1 цунь, в углублении между сухожилиями</p>	<p>лихорадочные состояния, чувство беспокойства, неврогенные боли в области сердца; головная боль, шум в ушах, головокружение, гипотензия; боль в горле; боли в глазах, плече, локтевом и лучезапястном суставах; астения</p>
<p><i>С6 инь-си</i></p>	<p>выше проксимальной лучезапястной складки на 0,5 цуня, в углублении между сухожилиями</p>	<p>боли в области сердца, тахикардия, озноб, ночные поты; носовое кровотечение; невроты, фобии</p>
<p><i>С7 шэнь-мэнь</i></p>	<p>у локтевого края лучезапястной складки, рядом с лучевой стороной сухожилия мышцы локтевой сгибатель кисти</p>	<p>одышка, боли в области сердца с чувством беспокойства; бессонница, фобии, ухудшение памяти; рвота с кровью, кровохарканье, желтушность склер, повышение температуры тела</p>
<p><i>С8 шао-фу</i></p>	<p>на ладони в углублении между IV и V пястными костями немного кзади от пястно-фаланговых суставов</p>	<p>сердцебиение, удушье, боль в груди, судорожное сведение пальцев; опущение влагалища и матки, боль и зуд в промежности; задержка или недержание мочи; тревожные состояния</p>

<p><i>С9 шао-чун</i></p>	<p>у лучевого края ногтевого ложа V пальца, выше от угла ногтя на 0,3 см</p>	<p>сердцебиение, удушье, боль в области сердца, аритмия; боль в груди и подреберье; астения, депрессия, чувство страха, нарушение мозгового кровообращения, потеря сознания</p>
--------------------------	--	---