

Название	Расположение	Показания
<b>МС1 тянь-чи</b>	четвертом межреберье, кнаружи от передней средней линии на 5 цуней	чувство удушья, одышка, кашель, пневмония, бронхит; боль в подреберье; инфильтрат в подмышечной области, мастит; боли в области груди, плеча, увеличение шейных, надключичных и подмышечных лимфатических узлов
<b>МС2 тянь-цюань</b>	на передневнутренней поверхности плеча, ниже уровня переднего конца складки подмышечной впадины на 2 цуня	боли в области сердца, боли за грудиной с иррадиацией в лопатку и по внутренней поверхности плеча; кашель, боль в груди и подреберье; рвота; снижение остроты зрения
<b>МС3 цюй-цзе</b>	в середине локтевого сгиба	боли в области сердца, стенокардия, тахикардия, чувство страха, тревоги, тремор рук; сухость во рту, потливость головы и шеи; повышение температуры тела; отрыжка, рвота
<b>МС4 си-мэнь</b>	выше проксимальной лучезапястной складки на 5 цуней	гипертермия ладоней и подошв; мастит; боли в области сердца и груди, тахикардия, чувство страха; астения; тошнота, рвота, боль в подреберье; кровотечение из носа; плеврит

<b>МС5 цзянь-ши</b>	выше проксимальной лучезапястной складки на 3 цуня	внезапная боль в области сердца, тахикардия; тревожные состояния, психозы; афония, ощущение инородного тела в горле, нарушение акта глотания, боли в желудке, рвота; нарушение менструального цикла; судороги у детей, эпилептиформные припадки; артриты рук; инфильтрат в подмышечной области, гипертермия ладоней, лихорадочные состояния
<b>МС6 нэй-гуань</b>	выше проксимальной лучезапястной складки на 2 цуня, между сухожилиями	боли в области сердца, стенокардия, тахикардия; заболевания органов грудной полости, кашель с астматическим компонентом, ларингит; гипертензия; отрыжка, рвота, боли в желудке, подреберье; боли и судороги в области локтевого сустава и плеча; лихорадочные состояния, эпилептиформные приступы; расстройства психики, сна, тревожные и маниакальные состояния
<b>МС7 да-лин</b>	в середине лучезапястной складки, в углублении между сухожилиями	боли в области сердца и грудной клетки, чувство беспокойства, нарушение сна, гипертензия с высоким систолическим давлением; боль в горле, нарушение акта глотания; тендовагинит, боли в локтевом, лучезапястном суставах, в предплечье; неврит срединного нерва; боли в области желудка, рвота с кровью; лихорадочные состояния; неврастения, эмоциональная лабильность, истерия

<b>МС8 лао-гун</b>	на середине ладони между III и IV пястными костями (при согнутых пальцах — между кончиками III и IV пальцев)	солнечный, тепловой удары; боли в области сердца, одышка, гипертензия; отсутствие аппетита; патологическая жажда; расстройство акта глотания, рвота; тремор рук, акроцианоз; артриты с ограничением движения суставов рук; судороги у детей; стоматит; психозы, истерические припадки; экзема на кистях
<b>МС9 чжун-чун</b>	на конце (в середине) ногтевой фаланги III пальца, отступя от ногтя 0,3 см	тепловой удар, предынсультное состояние, шок, боли в области сердца, чувство удушья и беспокойства; головная боль, лихорадочное состояние без потоотделения; астения, нарушение памяти; ночные страхи у детей